



Osmocote®
Topdress
Fusion Technology

4-5M

22-5-6+2MgO+TE



óxido

Nitrógeno Total (N)	22,0%
Nitrógeno nítrico (N-NO ₃)	4,9%
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₄)	5,8%
Nitrógeno ureico (N-Ur)	11,3%
Phosphorus Pentoxide (P ₂ O ₅)	5%
Water soluble (P ₂ O ₅)	3,7%
Potassium Oxide (K ₂ O)	6%
Water soluble (K ₂ O)	6,0%
Óxido de magnesio (MgO)	2,0%
Soluble en agua	1,0%
Hierro (Fe)	0,80%
Manganeso (Mn)	0,30%
Cobre (Cu)	0,050%
Zinc (Zn)	0,100%

Osmocote Topdress FT es un fertilizante encapsulado que se ha desarrollado especialmente para las aplicaciones de cobertera en contenedores de viveros. Contiene Fusion Technology, un componente especial que hace que el producto se adhiera al medio de cultivo después de la aplicación. De esta manera, los gránulos no se pierden si se hace un soplado de las macetas.

Ventajas

- Osmocote Topdress FT contiene fósforo y nitrógeno de liberación rápida y lenta.
- Tamaño de gránulo fino para distribución uniforme.
- Osmocote Topdress FT se adhiere al medio de cultivo: no se pierden gránulos en caso de que se tumben las plantas o cuando se manipulen para cambio de lugar o para su carga transporte.
- Osmocote Topdress FT no contiene polvo.
- Osmocote Topdress FT tiene un contenido extra de micronutrientes para provocar un efecto de reverdecimiento.

Características

Longevidad

4-5 meses

Descargar Ficha de Seguridad

Instrucciones de uso

Osmocote Topdress FT se ha desarrollado específicamente para las aplicaciones de cobertera en contenedores de viveros. Este producto se puede aplicar en la cobertera de las plantas en contenedor para conseguir un reverdecimiento rápido o para corregir con prontitud síntomas de deficiencias.

El abono en cobertera se puede realizar con riego por aspersión o por goteo. Si se usa riego por goteo, el producto se ha de aplicar directamente bajo los goteros.

El producto se puede aplicar con los aplicadores para cobertera recomendados por ICL Specialty Fertilizers. Consulte a su delegado de ICL Specialty Fertilizers si necesita más información.

Guardar en un lugar seco. Los sacos empezados o dañados se deben cerrar bien.

Recomendaciones

Dosis de aplicación recomendadas

	Contenedores < 10 litros	Contenedores > 10 litros
Plantas de vivero en contenedor	2-4 g/l	por cada litro adicional*

*Ejemplo

Dosis total si se usa un contenedor de 50 litros:

3 g/l para los primeros 10 litros = 30 gramos

1 g/l para los 40 litros adicionales = 40 gramos

Total = 30 + 40 = 70 gramos por contenedor de 50 litros

Atención

Reduzca estas dosis recomendadas si el material vegetal es sensible. Aplique el producto únicamente en cobertera. Si se emplea riego por goteo, coloque el producto bajo los goteros.

Este producto no está indicado para mezclas ni para aplicación directa en el hoyo de plantación en sustratos. Los productos Topdress no se pueden usar con sistemas de riego por capilaridad con esteras ni de riego por inundación y drenaje. Póngase en contacto con su delegado de ICL Specialty Fertilizers si necesita consejos más específicos.

Pruebe primero en una zona pequeña antes de implementar cambios de dosis, de forma de aplicación o de otro tipo en sus prácticas de cultivo. Dado que las circunstancias pueden variar y que la aplicación de nuestros productos se escapa de nuestro control, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL Specialty Fertilizers en caso de obtenerse resultados negativos.

